

VACCINARI RECOMANDATE PENTRU PREVENTIA RISCULUI BIOL

OGIC EXISTENT

LA LOCUL DE MUNCA AL ANGAJATILOR

VACCINARE ANTIGRIPALA Recomandata

pentru:

- lucratori cu publicul
- cadre didactice
- recrutatori
- lucratori comerciali (magazine)
- cadre medicale □ ingrijitori etc.

Avantaj angajator: reducerea absenteismului si a costurilor datorate scoaterii din productie.

Perioada optima de vaccinare: octombrie-noiembrie.

Vaccin: Vaxigrip Tetra (1 administrare)

VACCINARE ANTITETANICA

Recomandata pentru angajati cu risc crescut de contaminare accidentala:

- lacatusi
- sudori
- muncitori necalificati
- legatori de sarcina
- electricieni
- constructori etc

Avantaj angajator: reducerea absenteismului si a costurilor datorate scoaterii din productie.

Perioada optima de vaccinare: tot timpul anului

Vaccin: VTA (vaccin tetanic adsorbit- 3 administrari)

VACCINARE ANTIHEPATITA VIRALA TIP A

Hepatita virala tip A numita si "boala mainilor murdare", are calea de transmitere fecalorala.

Recomandata pentru:

- persoane care lucreaza in mediu cu expunere ridicata la conditii insalubre (subsoluri, conducte ingropate, scurgeri cu ape reziduale, instalatii sanitare si termoficare etc)

Avantaj angajator: reducerea absenteismului si a costurilor datorate scoaterii din productie.

Perioada optima de vaccinare: tot timpul anului

Vaccin: TWINRIX (3 administrari)

VACCINARE ANTIHEPATITA VIRALA TIP B

Calea de transmitere a Hepatitei virale tip B: sexuala, contactul cu sânge contaminat prin transfuzii, seringi re folosibile, stomatologie, prin instrumente de manichiură-frizerie, endoscopii, tatuaje etc. **Recomandata** pentru:

- cadre medicale
- conducatori auto profesioniști
- angajati care lucreaza in inchisori
- angajati care lucreaza in: saloane de manichiura-pedichiura, frizerie, coafura etc
- angajati care lucreaza cu sange sau produse din sange etc

Avantaj angajator: reducerea absenteismului si a costurilor datorate scoaterii din productie, reducerea cazurilor de accidente de munca secundara expunerii la Virusul hepatitic B.

Perioada optima de vaccinare: tot timpul anului

Vaccin: TWINRIX (3 administrari), Engerix B (3 administrari)

VACCINARE INTERNATIONALA

Medicul epidemiolog recomanda, in cadrul consultului de specialitate, o serie de vaccinari adaptate zonei geografice unde va merge pacientul.