

VACCINARI RECOMANDATE PENTRU PREVENTIA RISCULUI BIOLOGIC EXISTENT LA PACIENTI EXPUSI LA DIVERSI AGENTI PATOGENI

VACCINARE ANTIGRIPALA

Recomandata pentru:

- varstnici
- bolnavi cu afectiuni cronice
- femei gravide
- copii 2-5 ani
- sugari 6-23 luni
- lucratori cu publicul
- cadre didactice
- recrutatori
- lucratori comerciali (magazine)
- cadre medicale
- ingrijitori etc

Perioada optima de vaccinare: octombrie-noiembrie.

Vaccin: Vaxigrip Tetra (1 administrare)

VACCINARE ROTARIX

Rotarix se utilizeaza la **sugari** incepand **de la varsta de sase saptamani** pentru a-i proteja impotriva gastroenteritei (diaree si varsaturi) cauzate de infectia cu rotavirus Prima doza se administreaza cand sugarul are varsta peste sase saptamani. Este de preferat ca ambele doze sa se administreze inainte de varsta de 16 saptamani.

Aceeasi schema de vaccinare poate fi utilizata si la sugarii care s-au nascut cu pana la 13 saptamani inainte de termen (incepand cu varsta gestationala de 27 de saptamani). Rotarix se administreaza in doua doze, la un interval de cel putin patru saptamani.

VACCINARE ANTIPNEUMOCOCICA Recomandata

pentru:

- sugari, copii și adolescenți cu varsta cuprinsă între 6 săptămâni și 17 ani.
- adulți cu varsta ≥ 18 ani și la varstnici

Numar de administrari: o singura administrare la adulti, 2 sau 3 la sugari si copii in functie de indicatiile medicului.

Vaccin: Prevenar

VACCINARE ANTIRABICA

Recomandat urmatoarelor categorii de persoane: grupuri profesionale supuse la risc de contaminare, medici veterinari, asistenti veterinari (inclusiv studenti la facultatea de Medicina Veterinara), personalul tehnic ce lucreaza impreuna cu medicii veterinari, persoane din laboratoare ce manevreaza material contaminat cu virus rabic, persoane

din abatoare, targuri de animale, crescatori de animale, fermieri, lucratori forestieri din zone enzootice, persoane care calatoresc in zone enzootice: Africa, America de Sud, Asia.

Numar de administrari: 3

Vaccin: Verorab

VACCINARE PROFILAXIE RUBEOLA, RUJEOLA, OREION Recomandari:

- Imunizarea activa fata de rujeola, oreion si rubeola, incepand cu varsta de 12 luni, la copii de ambele sexe.
- Imunizarea activa a copiilor care traiesc in colectivitati (crese, gradinite), incepand cu varsta de 9 luni. In acest caz este necesara revaccinarea copilului la varsta de 15 luni, cu acelasi vaccin Trimovax pentru a asigura o protectie perfecta.
- Imunizarea in cadrul masurilor preventive de vaccinare, a tuturor copiilor mai mari de 9 luni, dintr-o colectivitate, daca exista un risc epidemiologic.

Numar de administrari: pentru vaccinare este necesara o singura administrare, daca varsta copilului este cuprinsa intre 12-15 luni. Daca vaccinarea s-a inceput la varsta de 9 luni, pentru copii care traiesc in colectivitati, o a 2- a injectie este recomandata 6 luni mai tarziu (la varsta de 15 luni).

Vaccin: Priorix

VACCINARE ANTITETANICA

Recomandata pentru angajati cu risc crescut de contaminare accidentala:

- lacatusi
- sudori
- muncitori necalificati
- legatori de sarcina
- electricieni
- constructori etc

Perioada optima de vaccinare: tot timpul anului

Vaccin: VTA (vaccin tetanic adsorbit- 3 administrari)

VACCINARE ANTIHEPATITA VIRALA TIP A

Hepatita virala tip A numita si "boala mainilor murdare", are calea de transmitere fecalorala.

Recomandata pentru:

- persoane care lucreaza in mediu cu expunere ridicata la conditii insalubre (subsoluri, conducte ingropate, scurgeri cu ape reziduale, instalatii sanitare si termoficare etc)

Perioada optima de vaccinare: tot timpul anului

Vaccin: TWINRIX (3 administrari)

VACCINARE ANTIHEPATITA VIRALA TIP B

Calea de transmitere a Hepatitei virale tip B: sexuala, contactul cu sânge contaminat prin transfuzii, seringi refolosibile, stomatologie, prin instrumente de manichiură-frizerie, endoscopii, tatuaje etc.

Recomandata pentru:

- cadre medicale
- conducatori auto profesioniști
- angajati care lucreaza in inchisori
- angajati care lucreaza in: saloane de manichiura-pedichiura, frizerie, coafura etc
- angajati care lucreaza cu sange sau produse din sange etc

Perioada optima de vaccinare: tot timpul anului

Vaccin: TWINRIX (3 administrari), Engerix B (3 administrari)

VACCINARE INTERNATIONALA

Medicul epidemiolog recomanda, in cadrul consultului de specialitate, o serie de vaccinari adaptate zonei geografice unde va merge pacientul.